

CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEL CORMORANO E DEGLI ARDEIDI NIDIFICANTI NEL LAZIO (2009)

CHRISTIAN ANGELICI⁽¹⁾, MASSIMO BIONDI⁽²⁾, MASSIMO BRUNELLI⁽¹⁾,
ENRICO CALVARIO⁽¹⁾, MICHELE CENTO⁽¹⁾, FERDINANDO CORBI⁽³⁾, LUCA DEMARTINI⁽⁴⁾,
LORIS PIETRELLI⁽⁵⁾, SILVANO ROMA⁽⁶⁾ & STEFANO SARROCCO⁽⁷⁾

⁽¹⁾ S.R.O.P.U. – Via Britannia, 36 – 00167 Roma

⁽²⁾ GAROL – Via del Castello, 17 – 00119 Roma

⁽³⁾ GPRO – Via Ticino, 12 – 04100 Latina

⁽⁴⁾ LIPU – Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – 00121 Roma

⁽⁵⁾ ALV – Via del Castello, 17 – 00119 Roma

⁽⁶⁾ GOC – Via Rifugio, 30 – 03023 Ceccano (FR)

⁽⁷⁾ Agenzia Regionale Parchi – Via del Pescaccio, 96 – 00166 Roma

La nidificazione del Cormorano e degli Ardeidi nel Lazio è un fenomeno relativamente recente: ad esclusione dell’Airone rosso e della Nitticora, per le quali erano già noti casi di nidificazione, tutte le altre specie hanno iniziato a nidificare a partire dal 2001 (cfr. Fasola et al., 2007). Nel presente contributo presentiamo lo status di tutte le specie oggetto della presente indagine rinvenute nidificanti nel territorio regionale (Fig. 1):

Cormorano. La nidificazione è stata accertata per la prima volta nel 2008 all’Isola Bisentina (Lago di Bolsena) con il rinvenimento di 4 coppie (Calvario et al., 2008). La nidificazione è stata confermata nel 2009 (3 coppie).

Airone cenerino. La nidificazione è stata accertata per la prima volta nel 2007 nel Lago di Nazzano con il rinvenimento di 1 coppia (Angelici & Brunelli, 2007). La nidificazione è stata confermata nel 2008 (2 coppie) (Angelici e Brunelli, 2008) e nel 2009 (8 coppie).

Airone rosso. È stato rinvenuto nidificante in 4 aree: CHM di Ostia dal 2004 (1-4 coppie) (Demartini et al., 2006); Vasche di Maccarese nel 2009 (1 coppia); Laghi Pontini nel 2009 (1-3 coppie); Lago di Fondi nel 2009 (1-3 coppie), in queste ultime due aree la specie ha probabilmente nidificato anche negli anni passati ma non si hanno dati circostanziati.

Garzetta. La nidificazione è stata accertata per la prima volta nel 2001 alle Saline di Tarquinia con il rinvenimento di 12 coppie (Rigoli et al., 2001), negli anni successivi la garzaia è cresciuta fino a raggiungere le 40 coppie nel 2008, in flessione nel 2009 (30 coppie). La specie è stata rinvenuta anche all’Isola Bisentina dal 2007 (2-4 coppie) (Calvario et al., 2007), confermata nel 2008 (5-6 coppie) e nel 2009 (8-10 coppie).

Airone guardabuoi. La nidificazione è stata accertata per la prima volta nel 2008 alle Saline di Tarquinia (12 coppie) (Biondi et al., 2008) e all’Isola Bisentina (2-3 coppie) (Calvario et al., 2008); nel 2009 è stata confermata la presenza rispettivamente di 15 coppie e di 1 coppia dubbia.




Fig. 1. Localizzazione dei siti di nidificazione di Cormorano e di Ardeidi nel Lazio (Anno 2009): 1-Isola Bisentina; 2-Laghi Reatini; 3-Lago di Nazzano; 4-Saline di Tarquinia; 5-Vasche di Maccarese; 6-Ostia; 7-Fiume Sacco; 8-Laghi Pontini; 9-Lago di Fondi.

Nitticora. È stata rinvenuta nidificante in 6 aree: Saline di Tarquinia dal 2009 (2 coppie); Lago di Bolsena dal 2007 (5-6 coppie) (Calvario et al., 2007), confermata nel 2008 (6-7 coppie) e nel 2009 (7-8 coppie); Laghi Reatini dal 2002 (16-18 coppie) (Brunelli & Sarrocco, 2001), in incremento fino al 2008 (20-25 coppie), in flessione nel 2009 (5-10 coppie), probabilmente in seguito all'installazione di reti per la protezione delle vasche di ittiocoltura presso le quali è sita la garzaia; Fiume Sacco dal

Specie / Sito	Isola Bisentina	Saline di Tarquinia	Laghi Reatini	Fiume Sacco	Lago di Nazzano	Ostia	Vasche di Maccarese	Laghi Pontini	Lago di Fondi	Totale
<i>Cormorano</i>	3									3
<i>Airone cenerino</i>					8					8
<i>Airone rosso</i>						4	1	1-3	1-3	7-11
<i>Garzetta</i>	8-10	30								38-40
<i>Airone guardabuoi</i>	0-1	15								15-16
<i>Nitticora</i>	7-8	2	5-10	100-110				5-10	1-5	120-145

Tab. 1. Consistenza delle popolazioni, espressa in numero di coppie, di Cormorano e di Ardeidi nidificanti nel Lazio (Anno 2009).

2002 (55 coppie) (Roma & Rossetti, 2003) in continuo incremento negli anni successivi (Roma, 2009), nel 2009 stimate 100-110 coppie; Laghi Pontini nel 2009 (5-10 coppie); Lago di Fondi nel 2009 (1-5 coppie), in queste ultime due aree la specie ha probabilmente nidificato anche negli anni passati ma non si hanno dati circostanziati. In Tabella 1 è riportata la consistenza delle popolazioni di tutte le specie oggetto della presente indagine aggiornata alla stagione riproduttiva 2009.

Summary

Distribution and abundance of breeding populations of Cormorant and Herons in Latium (2009)

The nesting of Cormorant and Herons recently appeared in Latium, in the first years of 2000s. During the breeding season of 2009 we censused the breeding populations of these species in the Region (Latium, Central Italy). The breeding pairs estimated are: Cormorant 3 pairs in one site; Grey Heron 8 pairs in one site; Purple Heron 4-11 pairs in four sites; White Egret 40 pairs in two sites; Cattle Heron 16 pairs in two sites and Night Heron 120-145 pairs in six sites.

BIBLIOGRAFIA

- Angelici C. e Brunelli M., 2007. Prima nidificazione accertata di Airone cenerino *Ardea cinerea* nel Lazio. *Alula*, XIV (1-2): 123-124.
- Angelici C. e Brunelli M., 2008. Gli uccelli della Riserva Naturale Regionale Tevere-Farfa. Edizioni Belvedere (Latina), collana "le scienze" (9), 100 pp.
- Biondi M., Pietrelli L., Meschini A., Cecchetti S., Moggi E. e Bruno M., 2008. Prima nidificazione di Airone guardabuoi, *Bubulcus ibis*, nel Lazio (Italia centrale). *Gli Uccelli d'Italia*, 33: 86-92.
- Brunelli M. e Sarrocco S., 2001. Accertata nidificazione di Nitticora *Nycticorax nycticorax* nella Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile (RI). *Alula*, VIII (1-2): 88-89.
- Calvario E., Brunelli M. e Bordignon L., 2007. Nidificazione di Nitticora *Nycticorax nycticorax* e di Garzetta *Egretta garzetta* nella ZPS del lago di Bolsena (VT). *Alula*, XIV (1-2): 126-127.
- Calvario E., Sarrocco S. e Brunelli M., 2008. Prima nidificazione di Cormorano *Phalacrocorax carbo* e nuovo sito riproduttivo di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* nel Lazio all'interno della ZPS Lago di Bolsena - Isole Bisentina e Martana. *Alula*, XV (1-2): 233-235.
- Demartini L., Sorace A., Cecere J.G., Savo E. e Polinori A., 2006. Atlante degli uccelli nidificanti nel centro urbano del Lido di Ostia. Associazione Centro Habitat Mediterraneo - LIPU, Regione Lazio.
- Fasola M., Albanese G., Asoer, Boano G., Boncompagni E., Bressan U., Brunelli M., Ciaccio A., Floris G., Grussu M., Guglielmi R., Guzzon C., Mezzavilla F., Paesani G., Sacchetti A., Sanna M., Scarton F., Scocianti C., Utmar P., Vaschetti G. e Velatta F., 2007. Le garzaie in Italia, 2002. *Avocetta*, 31: 5-46.
- Rigoli M., Biondi M., Laurenti S., Savo E. e Cecere J., 2001. Prima nidificazione di Garzetta *Egretta garzetta* nel Lazio (Italia Centrale). *Alula*, VIII (1-2): 69-73.
- Roma S., 2009. Status della colonia di Nitticora *Nycticorax nycticorax* in provincia di Frosinone. *Gli Uccelli d'Italia*, 34: 125.
- Roma S. e Rossetti M., 2003. Nidificazione di Nitticora *Nycticorax nycticorax* in provincia di Frosinone. *Alula*, X (1-2): 100-101.